

IMAGEN EN LA MEDICINA

# Queloides provocado por una perforación en la oreja, en una niña haitiana

## Keliod Caused by Ear Piercing in a Haitian Girl

Raúl Trujillo Alemán<sup>1</sup> Manuel Hernández Acosta.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Policlínico Manuel Piti Fajardo, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

### Cómo citar este artículo:

Trujillo-Alemán R, Hernández-Acosta. M. Queloides provocado por una perforación en la oreja, en una niña haitiana. **Medisur** [revista en Internet]. 2014 [citado 2024 Apr 26]; 12(1):[aprox. 1 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2429>

**Aprobado: 2013-10-31 11:55:57**

**Correspondencia:** Raúl Trujillo Alemán. Policlínico Manuel Piti Fajardo. Villa Clara. [rault@capiro.vcl.sld.cu](mailto:rault@capiro.vcl.sld.cu)



Datos generales de la paciente:

Edad: 9 años Sexo: femenina Raza: negra

Motivo de consulta: Aumento de volumen en el lóbulo de la oreja izquierda.

Historia de la enfermedad actual: después que se le perforo el lóbulo de la oreja para ponerle los aretes a los 3 años de edad la paciente comenzó

con aumento de volumen en dicho lugar, motivo por el cual se le retiró el arete, el aumento de volumen continuo y a los 9 años de edad acudió a consulta por ese motivo.

La raza negra, la predisposición familiar fueron las causas de este queloide, que creció tanto debido a la tardanza en acudir al médico por la escasez de estos en Haití.

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**