Descargado el: 24-04-2024 ISSN 1727-897X

IMAGEN EN LA MEDICINA

Queloide provocado por una perforación en la oreja, en una niña haitiana

Keliod Caused by Ear Piercing in a Haitian Girl

Raúl Trujillo Alemán[1] Manuel Hernández Acosta.[1]

[1] Policlinico Manuel Piti Fajardo, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

Cómo citar este artículo:
Trujillo-Alemán R, Hernández-Acosta. M. Queloide provocado por una perforación en la oreja, en una niña haitiana. **Medisur** [revista en Internet]. 2014 [citado 2024 Apr 24]; 12(1):[aprox. 1 p.]. Disponible en: http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2429

Aprobado: 2013-10-31 11:55:57

Correspondencia: Raúl Trujillo Alemán. Policlinico Manuel Piti Fajardo. Villa Clara. rault@capiro.vcl.sld.cu

 ISSN 1727-897X

Datos generales de la paciente:

Edad: 9 años Sexo: femenina Raza: negra

Motivo de consulta: Aumento de volumen en el lóbulo de la oreja izquierda.

Historia de la enfermedad actual: después que se le perforo el lóbulo de la oreja para ponerle los aretes a los 3 años de edad la paciente comenzó con aumento de volumen en dicho lugar, motivo por el cual se le retiró el arete, el aumento de volumen continuo y a los 9 años de edad acudió a consulta por ese motivo.

La raza negra, la predisposición familiar fueron las causas de este queloide, que creció tanto debido a la tardanza en acudir al médico por la escasez de estos en Haití.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS