

CARTA AL DIRECTOR

## Plasma rico en fibrina en la preservación del reborde alveolar Fibrin-rich plasma in the preservation of the alveolar ridge

Ramón Ahmed Pérez García<sup>1</sup> Julio I Romero Rodríguez<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, Cienfuegos, Cuba

### Cómo citar este artículo:

García R, Rodríguez J. Plasma rico en fibrina en la preservación del reborde alveolar. **Medisur** [revista en Internet]. 2021 [citado 2025 Mar 31]; 19(3):[aprox. 1 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5048>

---

**Aprobado: 2021-06-02 11:08:14**

**Correspondencia:** Ramón Ahmed Pérez García. Hospital Dr .Gustavo Aldereguía Lima. [ramon.perez@gal.sld.cu](mailto:ramon.perez@gal.sld.cu)

Estimado director:

El reborde alveolar es un tejido dependiente del órgano dental. Este se desarrolla durante la erupción dentaria y adopta la forma de acuerdo al eje dentario, grosor del diente y eventual inclinación de éste. Por lo tanto, una extracción dentaria conllevaría a la atrofia del reborde. Los mayores cambios dimensionales ocurren en el primer año postextracción, es por eso que se han ido desarrollando técnicas de preservación para disminuir su reabsorción y poder conseguir un volumen óseo suficiente que permita una adecuada reconstrucción protésica.

La fibrina rica en plaquetas (conocida por sus siglas como PRF) es un material de tipo autólogo, obtenida a partir de la sangre del mismo paciente sin ningún anticoagulante, trombina bovina u otro gel gelificante, la cual será centrifugada para obtener un coágulo de fibrina con una alta concentración de plaquetas y factores de crecimiento.<sup>(1)</sup> En los estudios científicos de los últimos años, se ha propuesto el uso de plasma rico en fibrina (PRF) para favorecer la disminución del colapso alveolar y así favorecer una mejor rehabilitación protésica estética y funcional.

En el artículo de corte experimental realizado por Deanira Quispe Gárate<sup>(2)</sup> sobre el efecto del uso de la fibrina rica en plaquetas según el protocolo de Choukroun, se evaluó la efectividad de PRF como material de relleno en los alveolos en dos grupos (uno experimental (PRF) y otro de control).

Al analizar los estudios científicos de los últimos años, realizados en diversos continentes se comprobó el potencial terapéutico que presenta el PRF en la preservación del reborde alveolar postexodoncia. Además de ser un proceder sencillo, aumenta la posibilidad de rehabilitación protésica. Sin embargo, aunque la evidencia científica revisada parezca mostrar que se pueden esperar resultados positivos de este tratamiento, el escaso número de

investigaciones y el bajo número de personas en las muestras estudiadas, es insuficiente para establecer recomendaciones generales.<sup>(3)</sup>

A través de este artículo, se pretende llamar la atención de la comunidad científica para incrementar los estudios del PRF en una muestra mayor de pacientes y evaluar su efecto, cumpliendo siempre los preceptos éticos. De esta manera los profesionales del sector podrán ofrecer a sus pacientes los mejores tratamientos basados en las mejores evidencias demostradas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, Dohan SL, Dohan AJ, Mouhyi J, Gogly B. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part I: technological concepts and evolution. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology [revista en Internet]. 2006 [ cited 3 Feb 2021 ] ; 101 (3): [aprox. 6p]. Available from: [https://www.puredent.dk/pdf/PRF\\_a\\_second\\_gen\\_part\\_2.pdf](https://www.puredent.dk/pdf/PRF_a_second_gen_part_2.pdf).
2. Quispe MD. Efecto del uso de la fibrina rica en plaquetas, según el protocolo de Choukroun, como único material en la preservación del reborde alveolar post-exodoncia [Tesis Doctoral]. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2018. Available from: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/8967>.
3. Sharma A, Ingole S, Deshpande M, Ranadive P, Sharma S, Kazi N, Rajurkar S. Influence of platelet-rich fibrin on wound healing and bone regeneration after tooth extraction: A clinical and radiographic study. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research [revista en Internet]. 2020 [ cited 15 Feb 2021 ] ; 10 (4): [aprox. 15p]. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212426820300804>.