

PUNTO DE VISTA

Determinantes sociales y salud mental en el manejo del duelo en tiempos de COVID-19

Social determinants and mental health in the management of grief in COVID-19 times

Andrés Joaquín Guarnizo Chávez¹  Nathaly Alejandra Romero Heredia² 

¹ Universidad Central del Ecuador, Ecuador

² Ministerio de Salud Pública, Ecuador

Cómo citar este artículo:

Guarnizo-Chávez A, Romero-Heredia N. Determinantes sociales y salud mental en el manejo del duelo en tiempos de COVID-19. **Medisur** [revista en Internet]. 2021 [citado 2021 Dic 8]; 19(5):[aprox. 2 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5198>

Resumen

La pandemia de COVID-19, sin lugar a dudas, ha dejado marcas profundas en la salud mental individual y colectiva. Aunque ciertamente el SARS-Cov2 es una enfermedad que no discrimina edad, sexo, estatus social, clase económica etc., si se ha evidenciado que ciertos determinantes sociales influyen altamente en su riesgo de mortalidad. Por tanto, estas muertes no serán vistas de la misma manera por todas las personas, sino que dependerá del contexto social en que ellas se devuelven. El manejo del proceso normal de duelo luego de una pérdida nunca es fácil, mucho menos si de por medio se encuentra la actual emergencia sanitaria y los problemas psicosociales que ésta conlleva.

Palabras clave: salud mental, determinantes sociales de la salud, aflicción, pesar, COVID-19

Abstract

The COVID-19 pandemic has undoubtedly left deep marks on individual and collective mental health. Although SARS-Cov2 is certainly a disease that does not discriminate age, sex, social status, economic class, etc., it has been shown that certain social determinants highly influence their risk of mortality. Therefore, these deaths will not be seen in the same way by all people, but will depend on the social context in which they exist. Managing the normal grieving process after a loss is never easy, much less if the current health emergency and the psychosocial problems that it entails are involved.

Key words: mental health, social determinants of health, bereavement, grief, COVID-19

Aprobado: 2021-09-01 13:35:48

Correspondencia: Andrés Joaquín Guarnizo Chávez. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. guarnizohcam@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La OMS define a los determinantes sociales de la salud como el conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones.⁽¹⁾ A su vez, nos indica, como salud mental, al estado de bienestar en el cual un individuo se da cuenta de sus propias aptitudes y puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.⁽²⁾

Si tales conceptos se toman en cuenta para el análisis de un proceso de duelo, al tratarse de una vivencia dramática por la pérdida de un ser querido, nos damos cuenta que tal dolor subjetivo no es solamente un estado anímico de límites rígidos,⁽³⁾ sino que más bien se puede entender como un proceso que se influye de aquellos determinantes, y se manifiesta de varias formas según el contexto psicosocial en el que se desenvuelve cada persona.

Así, más allá de los factores psicológicos, biológicos, y hasta genéticos, propios del individuo, también nos encontramos con estilos de vida y condiciones de salud que modifican el entorno del ser humano,⁽⁴⁾ y por tanto la respuesta del mismo hacia la adversidad, más aún si tomamos en cuenta que muchos de estos estilos de vida pudieron haber predispuesto la complicación y subsecuente mortalidad de un paciente por COVID-19.

Los factores ambientales, entendidos como aquellos del ambiente natural y más aún aquellos del ambiente social como las condiciones de vivienda, trabajo, escolaridad, ingresos económicos, pautas culturales, o incluso el acceso a servicios de salud de calidad, también influyen y limitan muchas veces el punto de vista de las personas sobre el manejo del duelo o el afrontamiento de la muerte que en algunos casos pudo haberse evitado de haber tenido el paciente mejores condiciones sociales.

DESARROLLO

Duelo en tiempos de COVID-19 y la influencia de los determinantes sociales. Observaciones durante la práctica

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de inequidades sanitarias. Factores como la distribución del dinero, poder y

recursos modifican la morbilidad y la mortalidad de una población determinada. La experiencia durante este periodo de pandemia nos ha demostrado la influencia de los determinantes, no solamente en cómo las personas desafían la enfermedad o las consecuencias de la misma, sino cómo han de adaptar sus creencias personales y sus condiciones, muchas veces limitadas, para afrontar la pérdida de un ser querido, o para lograr su propia estabilidad en la salud mental.⁽⁵⁾

En la práctica diaria de la salud, no son escasas, por ejemplo, las veces en que se observa al familiar del difunto, culpar de su deceso al sistema colapsado de hospitalización, a la falta de insumos médicos o camas en cuidados intensivos, y hasta al mismo personal sanitario que lo atendió. Sentimientos de culpa donde la gente cree que pudo haber hecho algo mejor por su familiar fallecido, o nunca perdonarse por “haber llevado el virus a su casa” son experiencias que se observan a diario. También la incertidumbre de su propia vulnerabilidad, o la posibilidad de nuevas pérdidas vuelven el duelo una situación social estresante.

De la misma forma, al conversar rutinariamente con familiares o amigos de un paciente fallecido, podemos ver que es frecuente el duelo sin despedida, porque, bien sea por confinamiento, aislamiento y cuarentena, no pudieron asistir al funeral y entierro de su difunto, o incluso dicho funeral ni siquiera se llevó a cabo por motivos de seguridad sanitaria. Y es en los sectores rurales donde más se sufren estas consecuencias, debido a la gran importancia cultural atribuida a la idiosincrasia espiritual, religiosa, étnica y ritualista predominante en sus comunidades.⁽⁶⁾

Manejo del duelo durante la pandemia

La mayoría de autores coinciden en que el duelo normal por el que toda persona pasa luego de una pérdida es un proceso continuo, en el que cada fase es necesaria para avanzar a la siguiente, teniendo así: la crisis, negación, enojo y depresión, como las fases en que la persona baja su estado anímico. Luego, mientras el paciente va recuperándose, aparecen la etapa de aceptación, y finalmente el aprendizaje.⁽⁷⁾ Por tanto, es entendible que, ante una alteración de cualquiera de las fases, el proceso no se complete o siga el curso de la manera adecuada.

Tenemos así un problema grave cuando en muchos lugares, sobre todo al inicio de la

pandemia por la cantidad excesiva de cadáveres, no se pudo entregar los mismos a sus familiares o incluso nunca supieron de su muerte de una manera certificada luego de su ingreso hospitalario. En estos casos el proceso de duelo fue alterado, y las repercusiones de todo tipo bien pudieron manifestarse como depresión, ansiedad, estrés, miedo patológico, síntomas psicósomáticos, etc.⁽⁸⁾

Es importante el acompañamiento psicológico en la elaboración del duelo normal, y el tratamiento psicoterapéutico si este duelo se vuelve patológico. Este acompañamiento debe ser empático y orientado hacia las necesidades específicas de la persona, una vez más tomando en cuenta los determinantes sociales de la salud que lo condicionan. Son importantes el contacto directo con la persona afectada, la escucha activa y el respeto.

Se recomienda utilizar estrategias acordes a las creencias o intereses personales, como rituales de despedida que integren a todos los miembros de la familia, tomando en cuenta el enfoque generacional y de género, espiritualidad, religiosidad, etc. También se pueden usar métodos más innovadores como cartas de despedida simbólicas, cajas de recuerdos del familiar fallecido, entre otras.⁽⁹⁾

CONCLUSIONES

El duelo es un proceso psicológico normal que se produce luego de una pérdida significativa, en contexto de pandemia se traduce principalmente a la afectación posterior a la muerte de un ser querido. Esta forma de afrontar la pérdida también está relacionada con los mismos determinantes sociales que condicionan la salud mental de las personas,

Se deben crear políticas públicas orientadas a la salud mental, así como fortalecer las ya existentes, a fin de evitar en la medida de lo posible que las desigualdades e inequidades sean otro factor en contra durante la actual pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ávila M. Hacia una nueva Salud Pública:

Determinantes de la Salud. Acta Méd Costarric [revista en Internet]. 2009 [cited 27 Abr 2021] ; 51 (2): [aprox. 3p]. Available from: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/amc/v51n2/art02v51n2.pdf>.

2. Ribot V, Chang N, González A. Efectos de la COVID-19 en la salud mental de la población. Rev Haban Cienc Méd [revista en Internet]. 2020 [cited 27 Abr 2021] ; 19 (1): [aprox. 10p]. Available from: <http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v19s1/1729-519X-rhcm-19-s1-e3307.pdf>.

3. Oviedo S, Parra F, Marquina M. La muerte y el duelo. Enferm Glob. 2009 ; 15 (1): 1-9.

4. Delgado H, Padrón E, Rodríguez L, Pedraza D, Álvarez A, Pérez A. Estudio de determinantes sociales y estado de salud de la población. Finlay [revista en Internet]. 2013 [cited 28 Abr 2021] ; 3 (4): [aprox. 8p]. Available from: <http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/articula/view/214/1146>.

5. Botero F, Rodríguez Espinosa G. COVID-19: ¿Una lupa de las inequidades en salud?. Rev Javer. 2020 ; 61 (3): 112-5.

6. Mora E. Los duelos del Covid-19. Rev Teol Pract Lat [revista en Internet]. 2021 [cited 29 Abr 2021] ; 1 (1): [aprox. 10p]. Available from: <http://revistas.ubl.ac.cr/index.php/tpl/article/view/164/563>.

7. Hernández J, Montoya I, Montoya L. Estrategias deliberadas y emergentes y su relación con el proceso de duelo psicológico: Resultados de un taller en gestión estratégica. Rev Virt Univ Cat Nor [revista en Internet]. 2020 [cited 29 Abr 2021] ; 61 (1): [aprox. 16p]. Available from: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/1942/194264514018/194264514018.pdf>.

8. Lacasta M, Torrijos M, López Y, Carracedo D, Pérez T, Casado C, et al. Impacto emocional en pacientes y familiares durante la pandemia por COVID-19. Un duelo diferente. Rev Virt Univ Cat Nor. 2020 [cited 29 Abr 2021] ; 27 (3): 201-8.

9. Araujo M, García S, García B. Abordaje del duelo y de la muerte en familiares de pacientes con COVID-19. Enferm Clin. 2020 [cited 30 Abr 2021] ; 31 (4): 112-6.