Descargado el: 27-11-2025 ISSN 1727-897X

### CARTA AL DIRECTOR

# Diagnóstico y tratamiento integral de la amelogénesis imperfecta Comprehensive diagnosis and treatment of amelogenesis imperfecta

Geidy Santos Hidalgo-Gato¹ Yarisley Enriquez Hidalgo² Luis Miguel Coto Valladares¹

<sup>1</sup> Clínica Estomatológica de Especialidades, Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba

#### Cómo citar este artículo:

Santos-Hidalgo-Gato G, Enriquez-Hidalgo Y, Coto-Valladares L. Diagnóstico y tratamiento integral de la amelogénesis imperfecta. **Medisur** [revista en Internet]. 2021 [citado 2025 Nov 27]; 20(1):[aprox. 2 p.]. Disponible en: <a href="https://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5115">https://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5115</a>

Aprobado: 2021-10-31 07:42:41

**Correspondencia:** Geidy Santos Hidalgo-Gato. Clínica Estomatológica de Especialidades. Cienfuegos <u>gsantoshidalgogato@gmail.com</u>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Policlínico Comunitario Universitario Área 5 Manuel Piti Fajardo, Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba

Descargado el: 27-11-2025 ISSN 1727-897X

#### Sr. director:

Varios estudios han demostrado que la amelogénesis imperfecta encierra un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios, los cuales afectan la formación del esmalte tanto en cantidad como en calidad, en la dentición primaria y permanente. Puede decirse que es una enfermedad rara y compromete a ambos sexos. Los informes varían mucho, en dependencia de la reserva genética. (1,2)

Existen numerosas clasificaciones de amelogénesis imperfecta, dígase según fenotipo, herencia, defectos moleculares y bioquímicos. Las diversas publicaciones de casos clínicos utilizan la clasificación según el fenotipo, la cual se basa en criterios clínicos y radiográficos. Han surgido nuevas clasificaciones, cada vez más complejas, fundadas en una combinación del fenotipo, la forma de herencia y los defectos moleculares y bioquímicos, con la limitación de que estos no siempre se conocen. A pesar de todos esos intentos nosológicos que tratan de ser cada vez más precisos, en la actualidad la clasificación más utilizada a nivel general sique siendo la de Witkop CJ Jr, revisada en 1988. Esta divide la amelogénesis imperfecta en cuatro tipos, atendiendo principalmente al fenotipo (hipoplásica, hipomadurativa, hipocalcificación e hipoplásica-hipomadurativa asociada con taurodontismo).(1,2,3)

La amelogénesis imperfecta afecta de forma más o menos homogénea a todos, o casi todos los dientes temporales y permanentes, y ocasionalmente, a otros tejidos orales y extraorales. Cada una de las variantes presenta características clínicas peculiares, las cuales dependen, a su vez, del estadio de formación del esmalte que se ve afectado en cada paciente. Desde el punto de vista clínico, el defecto del esmalte puede caracterizarse fundamentalmente por hipoplasia, hipomineralización o hipomaduración, aunque con frecuencia esas características no coexisten en el mismo paciente. (4,5)

Los pacientes con amelogénesis imperfecta se asocian a niveles significativamente más altos de evitación social y angustia, que los sujetos sin esta condición; en los adultos, se ha evidenciado un impacto social en la educación, satisfacción laboral y construcción de la familia. En niños y adolescentes, la preocupación radica en las implicaciones en el plano de las relaciones sociales con los de su edad, contexto en que las

burlas y la no aceptación por determinada característica pueden hacer mucho daño.

Para ellos, el objetivo más importante es la mejora del color de sus dientes. Y el tratamiento debe orientarse a ese fin, a devolverles la estética y la funcionalidad, con vistas a evitar consecuencias a largo plazo. Existen diversas técnicas y materiales para restaurar los dientes afectados por la amelogénesis imperfecta, como coronas totalmente cerámicas, coronas de metal y cerámica, carillas de porcelana y restauraciones directas e indirectas de resina compuesta; estas últimas con buenos resultados estéticos. (4,5,6)

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. Rodríguez S, Munayco ER, Ruiz C, Torres G, Blanco D, Chein S. Conservative treatment for an adolescent with amelogenesis imperfecta. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral [revista en Internet]. 2019 [ cited 13 Nov 2020 ] ; 12 (3): [aprox. 6p]. Available from: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S0719-01072019000300127&lng=es.
- 2. Hurtado P, Tobar F, Osorio J, Moreno F. Amelogénesis imperfecta en una familia. Rev Cubana Estomatol [revista en Internet]. 2018 [cited 14 Dic 2021]; 55 (2): [aprox. 5p]. Available from:

http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/1550/419.

- 3. López MC, Szwarc E. Diagnóstico y tratamiento integral en pacientes con Amelogénesis Imperfecta. Reporte de un caso. Rev Odontopediatr Latinoam [revista en Internet]. 2019 [ cited 13 Nov 2020 ] ; 9 (1): [aprox. 11p]. A vailable from: https://www.revistaodontopediatria.org/ediciones /2019/1/art-7/.
- 4. Da Silva C, De Andrea A, Galán J, Guarnieri C, Lojo A, Villanueva ME, et al. A propósito de un caso de Amelogénesis Imperfecta [Internet]. La Plata: Universidad Nacional de la Plata; 2017. [cited 13 Nov 2020 ] Available from: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/66479/Póster\_.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- 5. Valdivieso M, Ccorimanya L, Nieto S, Alfaro E, Ceccaño Y. Manejo integral del paciente con amelogénesis imperfecta. Odontol Pediatr. 2019;

Descargado el: 27-11-2025 ISSN 1727-897X

18 (1): 25-31.

6. Acosta MG, Natera A. Nivel de conocimiento de defectos de esmalte y su tratamiento entre odontopediatras. Rev Odontopediatr Latinoam [revista en Internet]. 2017 [ cited 13 Nov 2020 ]; 7 (1): [aprox. 22p]. Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/alop/rol-2017/rol171d.pdf.